

Cardiomiopatia Periparto: uma revisão sistemática de casos publicados nos últimos 5 anos

ID do trabalho: 24856

Luigi Campagnollo

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Ana Clara Oliver Machado

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Giulia Zaparoli Ursi

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Anna Thereza Rocha Pereira

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Marina Coronado Marques Camacho

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

?Beatriz Simone Firmino Sampaio

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Isabella Leibante Teixeira

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Anna Júlia Soeiro Munhoz

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

João Marcelo Lacreta Callil

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Pietra Morais Azi

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Vinícius Claro de Oliveira Filho


Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Vítor Hugo Soares Machado

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Introdução: A cardiomiopatia periparto é uma doença rara, marcada por disfunção cardíaca manifestada no período gestacional ou no período pós-parto. Sua principal apresentação clínica é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, provocando sintomas como dispneia, ortopneia, dor torácica e palpitações. Apesar de sua sintomatologia importante, a clínica pode, por vezes, ser desvalorizada, sendo atribuída a sintomas gravídicos, afetando o diagnóstico e manejo adequados. **Objetivo:** Elencar as principais manifestações clínicas da Cardiomiopatia Periparto relatadas na literatura nos últimos 5 anos. **Método:** Revisão Sistemática de Casos Publicados, constituída por relatos de casos selecionados nas plataformas: PubMed e Scielo, publicados entre 2019 e 2023, com descritor "cardiomiopatia periparto", filtros "Case Series" e "Case Reports" e idiomas inglês, português e espanhol. O programa Microsoft Excel® foi escolhido para tabulação de dados e cálculos estatísticos. Variáveis contínuas foram apresentadas como média \pm desvio padrão e dados categóricos como porcentagens/valores absolutos. **Resultados:** Foram selecionados 53 artigos, totalizando 79 casos relatados. A média de idade das pacientes foi de 30 ± 10 anos, sendo que a maioria dos eventos ocorreu após o parto (73%), sendo estes em sua maioria (56%) via cesariana. Os principais eventos relatados são dispneia, presente em 54% dos casos (N=43), taquicardia sinusal, em 43% dos casos (N=34) e edema de membros inferiores, em 38% das pacientes (N=30). Quanto ao ecocardiograma, destacaram-se a hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda. A fração de ejeção (FEJ) média das pacientes foi de $28 \pm 16\%$. Os demais achados clínicos constam no gráfico 1. **Conclusão:** As principais manifestações levantadas foram dispneia, taquicardia sinusal e edema de membros inferiores. Com isso, são necessários novos estudos com o intuito de distinguir - de forma satisfatória - seus sintomas dos sintomas gravídicos comuns, propiciando manejo mais adequado e prevenindo desfechos indesejáveis.

Gráfico 1: Principais achados clínicos e ecocardiográficos



Palavras-chave

cardiomiopatia periparto, insuficiência cardíaca

Ao submeter este resumo, o autor confirma que todos os coautores concordam e aprovaram a versão final do resumo e que seus dados de nome e instituição são acurados.

De acordo

Prêmio Destaque Cardiologia da Mulher - Ao optar por concorrer a este prêmio, o autor confirma que seu tema livre tenha enfoque primário nas doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares em mulheres. Isto inclui diferenças entre os sexos neste tópico.